Notes

Photos provided by Stefan Endepols.
Design: www.cambridgemarketing.co.uk

Rodenticide Resistance Action Committee (RRAC)
WWW.RRAC.INFO

CropLife International aisbl
326 AVENUE LOUISE, BOX 35
1050 BRUSSELS
BELGIUM

TEL +32 2 542 04 10
FAX +32 2 542 04 19
CROPLIFE@CROPLIFE.ORG

WWW.CROPLIFE.ORG

Date of publication: January 2016

Helping Farmers Grow

Liste des difficultés que rencontrent les utilisateurs de rodenticides

Problème Traitement

Produit étiqueté pour cette utilisation spécifique?

- Non → **Utiliser un produit avec étiquetage approprié.** (1)
- Oui ↓

Appât consommé par les rongeurs?

- Non → **Repositionner l'appât et/ ou augmenter l'appétence en améliorant l'accessibilité de l'appât en place ou le remplacer par autre.** (2)
- Oui ↓

Durée d'exposition des appâts suffisante?

- Non → **Continuer appâtage.** (3)
- Oui ↓

Mettez-vous suffisamment d'appât et remplacez-vous les appâts consommés?

- Non → **Suivre instructions appâtage et s'assurer que vous avez trouvé tous les refuges des rongeurs.** (4)
- Oui ↓

Avez-vous complètement exploré la zone?

- Non → **Suivre instructions appâtage et s'assurer que vous avez trouvé tous les refuges des rongeurs.** (5)
- Oui ↓

Avez vous vérifié si les rongeurs peuvent transiter facilement sur le site?

- Non → **Contrôler éventuels signes d'activité de rongeurs dans les zones alentours. Continuer appâtage.** (6)
- Oui ↓

Contacter Distributeur pour Conseil. Eventuel problème de résistance.

Liste des difficultés que rencontrent les utilisateurs de rodenticides

LES ÉTIQUETTES PRODUITS CONTIENNENT DES INFORMATIONS CONCERNANT LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET LES CONSEILS DE SÉCURITÉ À APPLIQUER PENDANT L'UTILISATION. COMME POUR TOUT PESTICIDE, IL EST ESSENTIEL QUE LES ÉTIQUETTES SOIENT LUES ET COMPRISES AVANT UTILISATION.

1 Tous les rodenticides ne sont pas étiquetés pour une utilisation contre toutes les espèces de rongeurs, car les rongeurs ont une sensibilité différente face à certaines substances actives. Quand vous utilisez des concentrats, assurez-vous que le mélange soit effectué conformément aux préconisations de l'étiquette sur l'étiquette.

2 Le positionnement des appâts est souvent critique. Ils doivent être placés de manière appropriée, là où il y a des signes de présence de rongeurs, par exemple dans les coulées entre le refuge du rongeur et les points d'alimentation habituels, dans les zones où l'on observe des fèces et autres signes d'activité. Un point d'appât placé même à un mètre de distance d'une coulée normalement utilisée peut ne pas être découvert. Une exploration approfondie du site est essentielle, voir point 5.

Dans les sites où la nourriture naturelle des rongeurs est très attractive, certains appâts peuvent ne pas être suffisamment appétents. Le fait de changer l'appât de base ou d'utiliser un autre produit approuvé peut souvent résoudre ce problème. Quand c'est possible, enlever ou sceller l'alimentation alternative.

3 Tous les rodenticides anticoagulants sont à action lente, plusieurs jours sont nécessaires pour présenter un effet létal.

De plus, même avec une infestation modérée, certains rongeurs peuvent mettre plusieurs jours avant de consommer l'appât. L'éradication complète peut prendre quelques semaines.

4 Il est important de ne pas sous-estimer la taille de l'infestation. Dans ce cas, les appâts complètement consommés sont un signe certain que les quantités et/ou nombres de point d'appâtage utilisés sont insuffisants.

5 Il est non seulement important de poser des appâts dans les zones de présence avérée mais aussi de trouver les refuges qui sont cachés ou à distance du site principal. Si ceux-ci sont négligés, ils agiront comme un réservoir de population. Un contrôle approfondi est absolument essentiel.

6 Quand une infestation a été éradiquée par l'utilisation efficace d'un rodenticide, les rongeurs aux alentours peuvent rapidement envahir le territoire dépeuplé et donner l'impression que le produit n'a pas fonctionné. Vérifiez s'il y a des signes d'infestation sur les propriétés aux alentours et mettez de l'appât si possible et/ou prenez en compte le périmètre d'appâtage et de contrôle.