





No

Avvalersi di un prodotto più adatto per il tipo di uso. **1**

No

Ricollocare l'esca e/o aumentarne l'attrattività. In alternativa usare un altro formulato. **2**

No

Continuate a trattare l'area per un periodo di tempo sufficiente. **3**

No

Seguite le istruzioni riguardanti l'applicazione dell'esca e verificate che tutti i nascondigli siano stati individuati. **4**

No

Seguite le istruzioni riguardanti l'applicazione dell'esca e verificate che tutti i nascondigli siano stati individuati. **5**

No

Controllare le aree adiacenti per individuare possibili segni di attività di roditori. Continuate a trattare l'area con l'esca. **6**

Guida a punti per derattizzatori che riscontrano problemi con esche rodenticide

**LE ETICHETTE DEI VARI PRODOTTI CONTENGONO CONSIGLI DI PRUDENZA E INFORMAZIONI SU COME UTILIZZARE CORRETTAMENTE IL PRODOTTO. COME PER OGNI PESTICIDA, È FONDAMENTALE LEGGERE ATTENTAMENTE L'ETICHETTA DEL PRODOTTO E COMPRENDERE QUANTO SCRITTO PRIMA DI UTILIZZARE UN PRODOTTO RODENTICIDA.**

**1** Non tutte le esche rodenticide sono adatte per l'uso contro tutte le specie di roditori poiché ogni roditore differisce dall'altro in termini di suscettibilità a particolari sostanze attive. Se utilizzate prodotti concentrati, verificate che la fase di mescolamento sia svolta correttamente secondo quanto riportato nelle istruzioni.

**2** Il corretto posizionamento delle esche è spesso di fondamentale importanza. Devono essere collocate in maniera opportuna, dove ci siano segni di attività di roditori, come per esempio nei passaggi tra il nascondiglio del roditore e il luogo fonte di cibo, in zone dove siano evidenti escrementi o altri segni di attività. Un'esca posizionata anche solo un metro lontano dal percorso normalmente fatto dal roditore potrebbe non essere notata. Una accurata ispezione del sito infestato è essenziale (vedete il punto 5).  
In luoghi ove la fonte quotidiana di cibo sia altamente appetibile alcune esche potrebbero non essere sufficientemente attrattive. Cambiare la tipologia di punto esca o cambiare prodotto/formulato, purché autorizzato, spesso può risolvere questo tipo di problema. Qualora possibile, fonti alternative di cibo devono essere rimosse o, in alternativa, sigillate.

**3** Tutti i prodotti anticoagulanti ad uso rodenticida agiscono lentamente; alcuni giorni sono richiesti prima che si manifesti l'effetto letale del prodotto. Inoltre, anche in luoghi moderatamente infestati, possono passare alcuni giorni prima che alcuni roditori inizino a cibarsi dell'esca. La completa eradicazione può richiedere anche alcune settimane.

**4** E' molto importante non sottovalutare la grandezza dell'infestazione. In questi casi, se l'esca è completamente mangiata, questo è un chiaro segno che la quantità di prodotto applicato è insufficiente e/o è stato previsto un inadeguato numero di punti esca.

**5** E' fondamentale posizionare le esche non solo nelle aree in cui l'attività dei roditori è certa, ma scoprire anche nascondigli lontani dal sito di infestazione principale. Se tali luoghi vengono ignorati possono fungere da bacino per una ripopolazione dell'area. Un'attenta e approfondita ispezione dell'area è dunque necessaria.

**6** Quando una infestazione è risolta attraverso l'uso di prodotti rodenticidi, roditori da aree/luoghi adiacenti possono facilmente re-invadere il territorio trattato e dare l'impressione che il trattamento non abbia funzionato correttamente. Ispezionare le proprietà adiacenti alla ricerca di segni di infestazione e posizionare alcune esche per valutare le zone perimetrali alla ricerca di tracce.