


Problema a tratar

Lista de chequeo para usuarios de rodenticidas



1

No todos los rodenticidas están etiquetados para uso contra todas las especies de roedores, ya que éstos tienen diferente sensibilidad según la sustancia activa.

2

La manera de colocar el cebo es decisiva. Tienen que posicionarse de manera adecuada, donde se encuentren signos de presencia de roedores, por ejemplo, en los caminos entre sus madrigueras y los puntos donde se alimentan, en zonas donde se perciban excrementos y signos de actividad. Un punto de cebo situado incluso un metro fuera del camino utilizado puede no ser detectado por los roedores. Una exploración minuciosa de la zona es esencial. Vea 5.

En zonas en las que la comida natural de los roedores es altamente atractiva, ciertos cebos no serán lo suficientemente apetecibles. Un cambio de base de cebo o incluso de producto autorizado puede en ocasiones resolver este problema. Cuando sea posible se debe eliminar la presencia de comida alternativa o aislarla.

3

Todos los rodenticidas anticoagulantes son de acción lenta: son necesarios varios días para que el efecto letal se manifieste. Además, incluso cuando se trata de plagas moderadas, puede que se necesiten varios días hasta que se produzca el consumo del cebo. La erradicación completa puede tardar varias semanas.

4

Es importante no subestimar el tamaño de la plaga. En estos casos, el consumo total de cebo es un signo fiable de que la cantidad de cebo utilizada o el número de puntos de cebo utilizados no son los adecuados.

5

Es importante posicionar el cebo no solamente en las zonas en las que se haya detectado presencia de roedores, sino también el hallar madrigueras que se encuentren más escondidas o apartadas del sitio principal. Si éstas no son controladas, los roedores las utilizarán como refugio. Una exploración minuciosa de la zona es esencial.

6

Cuando una plaga se haya eliminado gracias al uso eficaz de un rodenticida, los roedores de los alrededores repoblarán enseguida el territorio desocupado y parecerá que el producto no ha funcionado. Compruebe si existen signos de presencia de roedores en los alrededores y utilice cebos si es posible y/o tenga en cuenta el perímetro de posicionamiento de cebo adecuado.